

Asacol 1 g Zäpfchen – Pflichttext nach HWG §4

Asacol® 1 g Zäpfchen.

Wirkstoff: Mesalazin.

Zusammensetzung: 1 Zäpfchen. enth. 1 g Mesalazin.

Sonstige Bestandteile: Hartfett.

Anwendungsgebiete: Behandlung leichter bis mittelschwerer Colitis ulcerosa, die auf den Enddarm beschränkt ist.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gg. Salicylate od. d. sonst. Bestandteile, schwere Leber- und Nierenfunktionsstörungen.

Nebenwirkungen: *Selten* ($\geq 1/10.000$ bis $< 1/1.000$): Kopfschmerzen, Schwindel, Myokarditis, Perikarditis, Abdominalschmerzen, Diarrhö, Flatulenz, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Lichtempfindlichkeit. *Sehr selten* ($< 1/10.000$): Verändertes Blutbild (aplastische Anämie, Agranulozytose, Panzytopenie, Neutropenie, Leukopenie, Thrombozytopenie), Periphere Neuropathie, allergische u. fibrotische Lungenreaktionen (einschl. Dyspnoe, Husten, Bronchospasmus, Alveolitis, pulmonare Eosinophilie, Lungeninfiltrat, Pneumonitis), akute Pankreatitis, Nierenfunktionsstörungen einschl. akuter u. chronischer interstitieller Nephritis u. Niereninsuffizienz, Alopezie, Myalgie, Arthralgie, Überempfindlichkeitsreakt. w. allerg. Exanthem, Arzneimittelfieber, Lupus erythematosus Syndrom, Pankolitis, Veränderungen d. Leberfunktionsparameter (Erhöh. d. Transaminasen u. Cholestaseparameter), Hepatitis, cholestatische Hepatitis, Oligospermie (reversibel). *Nicht bekannt* (*nicht aus den verfügbaren Daten abschätzbar*): Idiopathische intrakranielle Hypertension, Nephrolithiasis, Arzneimittelreakt. m. Eosinophilie u. system. Symptomen (DRESS-Syndrom), Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse.

Verschreibungspflichtig.

Stand der Information: Januar 2025.

Pharmazeutischer Unternehmer: Tillotts Pharma GmbH, Warmbacher Str. 80, DE-79618 Rheinfelden, www.tillotts.de